

## 標準CHOP療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21
CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○	
DXR	50mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○	
VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>	iv	5分		○	

day1からの投与間隔 3週間

VCR: 上限2mg/bodyまで

## THP-COP療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21
CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○	
THP	50mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○	
VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>	iv	5分		○	

day1からの投与間隔 3週間

VCR: 上限2mg/bodyまで

## R-CHOP療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	21
Rituximab	375mg/m <sup>2</sup>	div			○		
CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	2時間			○	
DXR	50mg/m <sup>2</sup>	div	1時間			○	
VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>	iv	5分			○	

day1からの投与間隔 3週間

Rituximab: 生理食塩液または5%ブドウ糖液にて10倍に希釈。

初回投与時: 最初の1時間は25mg/hrの速度で開始し、その後100mg/hrで1時間、さらにその後200mg/hrまで速度を上げることが可能

VCR: 上限2mg/bodyまで

## C-weekly療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	・	・
CPA	500mg/m <sup>2</sup>	div	1.5~2時間		○	○	○	・	・

## COP-MP療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	3	8	9	10	15	16	17	29	30	31
CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	1.5~2時間		○			○			○					
VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>	iv	5分		○			○			○					
PSL	60mg/m <sup>2</sup>	p.o	1日2回		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
L-PAM	8mg/m <sup>2</sup>	p.o	1日2回											○	○	○

3投3休 2コース

## リツキシマブ療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day 1	8	15	・	・
RIT	375mg/m <sup>2</sup>	div		○	○	○	・	・

毎週投与 最大投与回数8回

Rituximab: 生理食塩液または5%ブドウ糖液にて10倍に希釈。

初回投与時:最初の1時間は25mg/hrの速度で開始し、その後100mg/hrで1時間、さらにその後200mg/hrまで速度を上げることが可能

## ABVd療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day 1	15	28
DXR	25mg/m <sup>2</sup>	div	30分	○	○	
BLM	10mg/m <sup>2</sup>	div	1時間	○	○	
VLB	6mg/m <sup>2</sup>	div	10~20分	○	○	
DTIC	375mg/m <sup>2</sup>	div	1時間	○	○	

day1からの投与間隔 4週間

## ベルケイド療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day 1	4	8	11	21
ベルケイド	1.3mg/m <sup>2</sup>	iv	数秒	○	○	○	○	

day1からの投与間隔 3週間

維持療法(8コース目以降)は週1回投与(day1、8、15、22)で投与間隔は5週間

## レミケード療法(関節リウマチ)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day 1	15	43	99
レミケード	3mg/kg	div	2時間	○	○	○	○
リウマトレックス	6mg/m <sup>2</sup>	p.o	1週間毎	○			

レミケードは初回投与後、2週・6週に投与し以後8週間の間隔で投与

投与間隔8週であれば10mg/kg、短縮した場合は6mg/kgまで増量可

併用薬として通常1週間単位の投与量をMTXとして6mgとし、本剤1カプセル(MTXとして2mg)を初日から2日間かけて12時間間隔で3回経口投与し、残り5日間は休薬する。

これを1週間ごとに繰り返す。

## GEM単独療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day 1	8	15	28
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	div	30分	○	○	○	

day1からの投与間隔4週間

### VcR-CAP①療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	3	4	5	8	11	21
VEL	1.3mg/m <sup>2</sup>	iv			○			○		○	○	
RIT	375mg/m <sup>2</sup>	div	※		○							
DXR	50mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○							
CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○							
PSL	100mg/m <sup>2</sup>	p.o			○	○	○	○	○			

day1からの投与間隔3週間

※初回投与時:最初の1時間は25mg/hrの速度で開始し、その後100mg/hrで1時間、さらにその後200mg/hrまで速度を上げることが可能

### VcR-CAP②療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	3	4	5	6	9	12	21
VEL	1.3mg/m <sup>2</sup>	iv				○			○		○	○	
RIT	375mg/m <sup>2</sup>	div	※		○								
DXR	50mg/m <sup>2</sup>	div	1時間			○							
CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	2時間			○							
PSL	100mg/m <sup>2</sup>	p.o				○	○	○	○	○			

day1からの投与間隔3週間

※初回投与時:最初の1時間は25mg/hrの速度で開始し、その後100mg/hrで1時間、さらにその後200mg/hrまで速度を上げることが可能

### VcR-C・THP-A・P①療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	3	4	5	8	11	21
VEL	1.3mg/m <sup>2</sup>	iv			○			○		○	○	
RIT	375mg/m <sup>2</sup>	div	※		○							
THP	30mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○							
CPA	500mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○							
PSL	30mg/m <sup>2</sup>	p.o			○	○	○	○	○			

day1からの投与間隔3週間

※初回投与時:最初の1時間は25mg/hrの速度で開始し、その後100mg/hrで1時間、さらにその後200mg/hrまで速度を上げることが可能

### VcR-C・THP-A・P②療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	3	4	5	6	9	12	21
VEL	1.3mg/m <sup>2</sup>	iv				○			○		○	○	
RIT	375mg/m <sup>2</sup>	div	※		○								
THP	30mg/m <sup>2</sup>	div	1時間			○							
CPA	500mg/m <sup>2</sup>	div	2時間			○							
PSL	30mg/m <sup>2</sup>	p.o				○	○	○	○	○			

day1からの投与間隔3週間

※初回投与時:最初の1時間は25mg/hrの速度で開始し、その後100mg/hrで1時間、さらにその後200mg/hrまで速度を上げることが可能

## Kd療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	8	9	15	16	22	23	28
カイプロリス	56mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○	○	○	○	○	○			
DEX	20mg	div	30分		○	○	○	○	○	○	○	○	○

day1からの投与間隔4週間

## KRd療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	8	9	15	16	21	22	28
カイプロリス	20mg/m <sup>2</sup>	div	10分		○	○							
カイプロリス	27mg/m <sup>2</sup>	div	10分				○	○	○	○			
レブラミド	25mg	p.o			○	→							
DEX	40mg	div	30分		○		○		○			○	

day1からの投与間隔4週間

## brentuximab(アドセトリス)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21
アドセトリス	1.8mg/kg	div	30分		○	

day1からの投与間隔3週間

## nivolumab(オプジーボ)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	14
nivolumab	240mg/body	div	30分以上		○		

day1からの投与間隔 2週間

## G-CHOP療法(1コース目)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	8	15	21
ガザイバ	1000mg/body	div	3~4時間		○		○	○	
CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	2時間			○			
DXR	50mg/m <sup>2</sup>	div	1時間			○			
VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>	div	10分			○			

day1からの投与間隔 3週間

### G-CHOP療法(2~6コース目)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	21
ガザイバ	1000mg/body	div	3~4時間		○		
CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	2時間			○	
DXR	50mg/m <sup>2</sup>	div	1時間			○	
VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>	div	10分			○	

day1からの投与間隔 3週間

### G-CHOP療法(7~8コース目)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21
ガザイバ	1000mg/body	div	3~4時間		○	

day1からの投与間隔 3週間

### G-THP・COP療法(1コース目)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	8	15	21
ガザイバ	1000mg/body	div	3~4時間		○		○	○	
CPA	500mg/m <sup>2</sup>	div	2時間			○			
THP	30mg/m <sup>2</sup>	div	1時間			○			
VCR	1mg/m <sup>2</sup>	div	10分			○			

day1からの投与間隔 3週間

### G-THP・COP療法(2~6コース目)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	21
ガザイバ	1000mg/body	div	3~4時間		○		
CPA	500mg/m <sup>2</sup>	div	2時間			○	
THP	30mg/m <sup>2</sup>	div	1時間			○	
VCR	1mg/m <sup>2</sup>	div	10分			○	

day1からの投与間隔 3週間

### G-THP・COP療法(7~8コース目)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21
ガザイバ	1000mg/body	div	3~4時間		○	

day1からの投与間隔 3週間

### G-CVP療法(1コース目)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	8	15	21
ガザイバ	1000mg/body	div	3~4時間		○		○	○	
CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	2時間			○			
VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>	div	10分			○			

day1からの投与間隔 3週間

### G-CVP療法(2~8コース目)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	21
ガザイバ	1000mg/body	div	3~4時間		○		
CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	2時間			○	
VCR	1.4mg/m <sup>2</sup>	div	10分			○	

day1からの投与間隔 3週間

### GB療法(1コース目)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	3	8	15	28
ガザイバ	1000mg/body	div	3~4時間		○			○	○	
ベンダムスチン	90mg/m <sup>2</sup>	div	1時間			○	○			

day1からの投与間隔 4週間

### GB療法(2~6コース目)

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	3	28
ガザイバ	1000mg/body	div	3~4時間		○			
ベンダムスチン	90mg/m <sup>2</sup>	div	1時間			○	○	

day1からの投与間隔 4週間

### ガザイバ維持療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	56
ガザイバ	1000mg/body	div	3~4時間		○	

day1からの投与間隔 8週間

### DBd療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	2	4	5	8	9	11	12	15
ダラザレックス	16mg/kg	div	7時間		○								
ダラザレックス	16mg/kg	div	4時間						○				
ダラザレックス	16mg/kg	div	3~4時間										○
VEL	1.3mg/m <sup>2</sup>	※	1分		○		○		○		○		
DEX	20mg/day	div	15分		○				○				
DEX	20mg/day	p.o					○	○	○		○	○	○

day1からの投与間隔3週間

※VELの投与方法はiv又はscどちらでも可能

## DLd療法

薬品名	投与量	投与法	投与時間	day	1	2	8	9	15	16	21	22	23
ダラザレックス	16mg/kg	div	7時間		○								
ダラザレックス	16mg/kg	div	4時間				○						
ダラザレックス	16mg/kg	div	3~4時間						○			○	
レブラミド	25mg/day	p.o			○	→							
DEX	20mg/day	div	15分		○		○		○			○	
DEX	20mg/day	p.o				○		○		○			○

day1からの投与間隔4週間

## MTX-HOPE療法

薬品名	投与量	投与法	投与時間	day	1	2	3	4
MTX	20mg/body	p.o			○			
ソル・コーテフ	100mg/body	div	30分			○		
VCR	1mg/body	div	15分			○		
ペラゾリン	400mg/body	p.o					○ ○	
ラステット	25mg/body	p.o					○ ○	

day1からの投与間隔3~4週間