

## weekly-PTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21	28
PTX	80mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○	○	○		

day1からの投与間隔 4週間

## GEM療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21	28
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○	○	○		

day1からの投与間隔 4週間

## ナベルピン療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
VNR	20~25mg/m <sup>2</sup>	div	5~10分		○	○		

day1からの投与間隔 3週間

## 5-FU/I-LV療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	29	36	43	50	56
5-FU	600mg/m <sup>2</sup> ※	div	5~10分		○	○	○	○	○	○			
I-LV	250mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○	○	○	○	○	○			

day1からの投与間隔 8週間

※術後補助化学療法として用いる場合は500mg/m<sup>2</sup>

## FEC75(5-FU+EPI+CPA)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
EPI	75mg/m <sup>2</sup> ※	div	全開で		○			
5-FU	500mg/m <sup>2</sup>	div	15分		○			
CPA	500mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○			

day1からの投与間隔 3週間

※FEC100の場合は100mg/m<sup>2</sup>

## 5-FU動注+CPT-11療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22
5-FU	1000mg/m <sup>2</sup>	ai	5時間		○		○	
5-FU	500mg/m <sup>2</sup>	ai	5時間			○		○
CPT-11	80mg/m <sup>2</sup>	div	1.5時間			○		○

day1からの投与間隔 2週間

## trastuzumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21	22
trastuzumab	8mg/kg	div	90分		○		
〃	6mg/kg	div	30分※				○

初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間  
 ※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

## trastuzumab+PTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21	22
trastuzumab	8mg/kg	div	90分		○		
〃	6mg/kg	div	30分※				○
PTX	100mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○		○

trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間  
 ※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

## レンチナン療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
レンチナン	2mg/body	div	30分		○	○		

day1からの投与間隔 3週間

## マイトマイシン療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	14
マイトマイシン	2mg/body	div	30分		○		

day1からの投与間隔 2週間

## PTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
PTX	210mg/m <sup>2</sup>	div	3時間		○			

day1からの投与間隔 3週間

## 5-FU動注療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	14
5-FU	1000mg/m <sup>2</sup>	ai	5時間		○	○	

day1からの投与間隔 2週間

## CPT-11療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	14
CPT-11	150mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○		

day1からの投与間隔 2週間

## cetuximab+CPT-11療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	29	36	43	50	・	・
cetuximab	400mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○									
〃	250mg/m <sup>2</sup>	div	1時間			○	○	○	○	○	○	○	・	・
CPT-11	100mg/m <sup>2</sup>	div	90分		○	○	○	○				○	○	・

cetuximabは初回のみ400mg/m<sup>2</sup>、2回目以降は250mg/m<sup>2</sup> 毎週投与  
day1からの投与間隔 6週間

## cetuximab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	・	・	・	・	・	・
cetuximab	400mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○									
〃	250mg/m <sup>2</sup>	div	1時間			○	○	○	・	・	・	・	・	・

初回のみ400mg/m<sup>2</sup>、2回目以降は250mg/m<sup>2</sup> 毎週投与

## CDDP+CPT-11療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	28
CDDP	80mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○				
CPT-11	70mg/m <sup>2</sup>	div	90分		○	○			

day1からの投与間隔 4週間

## CDDP+GEM療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
CDDP	25mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○	○		
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○	○		

day1からの投与間隔 3週間

## XELOX+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14	21
bevacizumab	7.5mg/kg	div	90分		○		
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○		
ゼローダ	2000mg/m <sup>2</sup> /day	p.o			○ →		

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能  
ゼローダはday1～day14 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後7日間休薬する。

## XELOX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14	21
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○		
ゼロータ	2000mg/m <sup>2</sup> /day	p.o			○	→	

day1からの投与間隔 3週間

ゼロータはday1～day14 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後7日間休薬する。

## XELODA+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14	21
bevacizumab	7.5mg/kg	div	90分		○		
ゼロータ	2000mg/m <sup>2</sup> /day	p.o			○	→	

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

ゼロータはday1～day14 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後7日間休薬する。

## GEM+PTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
PTX	175mg/m <sup>2</sup>	div	3時間		○			
GEM	1250mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○	○		

day1からの投与間隔 3週間

## EC(EPI+CPA)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
EPI	75mg/m <sup>2</sup>	div	15分		○			
CPA	500mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○			

day1からの投与間隔 3週間

## trastuzumab+weekly-PTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22
trastuzumab	8mg/kg	div	90分		○			
"	6mg/kg	div	30分※					○
PTX	80mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○	○	○	

trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

## panitumumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	15	28
panitumumab	6mg/kg	div	60分		○	○	

day1からの投与間隔 4週間

## weekly-PTX+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	28
PTX	100mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○	○	○	
bevacizumab	10mg/kg	div	90分※		○	○		

day1からの投与間隔 4週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

## eribulin療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
eribulin	1.4mg/m <sup>2</sup>	div	5分		○	○		

day1からの投与間隔 3週間

## trastuzumab+eribulin療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	29
trastuzumab	8mg/kg	div	90分		○				
"	6mg/kg	div	30分※					○	
eribulin	1.4mg/m <sup>2</sup>	div	5分		○	○		○	○

trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

## TC(DTX+CPA)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
DTX	75mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○			
CPA	600mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○			

day1からの投与間隔 3週間

## SOX+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14	21
bevacizumab	7.5mg/kg	div	90分		○		
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○		
S1	120mg/body	p.o			○	→	

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

S1はday1～day14 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後7日間休薬する。

## SOX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14	21
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○		
S1	120mg/body	p.o			○	→	

day1からの投与間隔 3週間

S1はday1～day14 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後7日間休薬する。

## Kadcyla療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
Kadcyla	3.6mg/kg	div	90分		○			

day1からの投与間隔 3週間  
初回は90分、2回目以降は30分に投与時間短縮可能

## Ram(サイラムザ) + PTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	28
Ram	8mg/kg	div	1時間		○		○	
PTX	80mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○	○	○	

day1からの投与間隔 4週間

## Ram(サイラムザ)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14
Ram	8mg/kg	div	1時間		○	

day1からの投与間隔 2週間

## pertuzumab+trastuzumab+DTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21	22
pertuzumab	840mg/body	div	1時間		○		
"	420mg/body	div	1時間				○
trastuzumab	8mg/kg	div	90分		○		
"	6mg/kg	div	30分※				○
DTX	75mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○		○

trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間  
※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

## pertuzumab+trastuzumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	21	22
pertuzumab	840mg/body	div	1時間		○		
"	420mg/body	div	1時間				○
trastuzumab	8mg/kg	div	90分		○		
"	6mg/kg	div	30分※				○

trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg 投与間隔 3週間  
※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

## trastuzumab+DTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	22	29	36
trastuzumab	4mg/kg	div	90分		○					
"	2mg/kg	div	30分※			○	○	○	○	○
DTX	75mg/m <sup>2</sup>	div	60分		○		○			

trastuzumabは初回のみ4mg/kg、2回目以降は2mg/kg

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

## nabPTX+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
nabPTX	260mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○			
bevacizumab	10mg/kg	div	90分※		○			

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

## weekly nabPTX+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21	28
nabPTX	100mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○	○	○		
bevacizumab	10mg/kg	div	90分※		○		○		

day1からの投与間隔 4週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

## DCS療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14	28
DTX	40mg/m <sup>2</sup>	div	60分		○		
CDDP	60mg/m <sup>2</sup>	div	2時間		○		
S1	80~120mg/body	p.o			○	→	

day1からの投与間隔 4週間

S1はday1夕~day15朝まで内服、その後14日間休薬する。

## nivolumab(オプジーボ)療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	14
nivolumab	240mg/body	div	30分以上		○		

day1からの投与間隔 2週間

## nabPTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21	28
nabPTX	100mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○	○	○		

day1からの投与間隔3~ 4週間

## VNR+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	21
VNR	25mg/m <sup>2</sup>	div	15分		○			
bevacizumab	10mg/kg	div	90分※		○			

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

## dose-densePTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	14
PTX	175mg/m <sup>2</sup>	div	3時間		○		

day1からの投与間隔 2週間

## nabPTX+Ram療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	8	15	28
nabPTX	100mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○	○	○	
Ram	8mg/kg	div	60分		○		○	

day1からの投与間隔 4週間

## XELIRI+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14	21
bevacizumab	7.5mg/kg	div	90分		○		
CPT-11	200mg/m <sup>2</sup>	div	90分		○		
ゼローダ	1600mg/m <sup>2</sup> /day	p.o			○	→	

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能  
ゼローダはday1～day14 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後7日間休薬する。

## TAS102+bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	5	8	12	15	28
bevacizumab	5mg/kg	div	30分		○					○
TAS102	35mg/m <sup>2</sup>	p.o			○	→	○	→		

day1からの投与間隔 4週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能  
TAS102はday1～5、day8～12 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後14日間休薬する。

## S1+DTX療法

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	day	1	14	21	22	35
DTX	40mg/m <sup>2</sup>	div	1時間					○	
S1	80～120mg/body	p.o			○	→	○	→	

day1からの投与間隔 3週間

DTXは2コース目より開始し7コース目まで計6回投与  
S1は1～7コース目までは2投1休、8コース目以降は4投2休



## GCS療法

薬品名	投与量	投与法	投与時間	day	1	7	14
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○		
CDDP	25mg/m <sup>2</sup>	div	1時間		○		
S1	80~120mg/body	p.o			○	→	

day1からの投与間隔 2週間

S1はday1~7まで内服、その後7日間休薬する。

## bevacizumab + eribulin療法

薬品名	投与量	投与法	投与時間	day	1	8	21
bevacizumab	15mg/kg	div	90分		○		
eribulin	1.4mg/m <sup>2</sup>	div	5分		○	○	

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

## S1 + bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与法	投与時間	day	1	14	21
bevacizumab	7.5mg/kg	div	90分		○		
S1	80mg/m <sup>2</sup>	p.o			○	→	

day1からの投与間隔 3週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

S1はday1~day14 朝食後・夕食後30分以内に内服。その後7日間休薬する。

## CPT11 + bevacizumab療法

薬品名	投与量	投与法	投与時間	day	1	14
bevacizumab	5mg/kg	div	90分		○	
CPT11	150mg/m <sup>2</sup>	div	90分		○	

day1からの投与間隔 2週間

※bevacizumabは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分と投与時間短縮可能

## nabPTX + Atezolizumab (テセントリク)療法

薬品名	投与量	投与法	投与時間	day	1	8	15	28
nabPTX	100mg/m <sup>2</sup>	div	30分		○	○	○	
テセントリク	840mg/body	div	60分		○		○	

day1からの投与間隔 4週間