

TCPF療法

(入院)				day	1	2	3	4	5	28
薬品名	投与量	投与法	投与時間							
ドセタキセル(DTX)	15mg/m ²	ai	48時間		○	○				
シスプラチン(CDDP)	15～30mg/m ²	ai	3時間				○			
ペブレオ(ペプロマイシン;販売中止)	10mg/body	ai	48時間					○	○	
フルオロウラシル(5-FU)	500mg/day	div	24時間		○	○	○	○	○	

day1からの投与間隔 4週間

weekly-CDDP療法

(入院)				day	1	8	15	22	29	36	42
薬品名	投与量	投与法	投与時間								
シスプラチン(CDDP)	30～50mg/m ²	ai	5時間		○	○	○	○	○	○	

day1からの投与間隔 6週間
≪放射線併用≫ 1日2Gy 30回 計60Gy

TCPF療法(2ルート)

(入院)				day	1	2	3	4	5	28
薬品名	投与量	投与法	投与時間							
ドセタキセル(DTX)	5～15mg/body	ai	48時間		○	○	○			
シスプラチン(CDDP)	10～30mg/body	ai	5時間				○			
ペブレオ(ペプロマイシン;販売中止)	10mg/body	ai	48時間				○	○	○	
フルオロウラシル(5-FU)	500mg/day	div	24時間		○	○	○	○	○	
ドセタキセル(DTX)	5～15mg/body	ai	3時間			○				

day1からの投与間隔 4週間
5-FU以外は投与量×2(ルート)で施行

DCF療法

(入院)				day	1	2	3	4	5	28
薬品名	投与量	投与法	投与時間							
ドセタキセル(DTX)	60mg/m ²	div	1時間		○					
シスプラチン(CDDP)	60mg/m ²	div	3時間		○					
フルオロウラシル(5-FU)	700mg/m ²	div	21時間		○					
フルオロウラシル(5-FU)	700mg/m ²	div	24時間			○	○	○	○	

day1からの投与間隔 3～4週間

Cmab+FP療法

(入院)(外来)				day	1	2	3	4	8	15
薬品名	投与量	投与法	投与時間							
アービタックス(セツキシマブ)	400mg/m ²	div	2時間		○					
アービタックス(セツキシマブ)	250mg/m ²	div	1時間						○	○
シスプラチン(CDDP)	100mg/m ²	div	1時間		○					
フルオロウラシル(5-FU)	1000mg/m ²	div	24時間		○	○	○	○		

アービタックス(セツキシマブ)は初回のみ400mg/m²、2回目以降は250mg/m² 毎週投与
day1からの投与間隔 3週間

DCPF動注療法

(入院)					day	1	2	3	4	5	14
薬品名	投与量	投与法	投与時間								
ドセタキセル(DTX)	15mg/m ²	ai	3時間			○	○				
シスプラチン(CDDP)	30mg/m ²	ai	3～5時間					○			
ペブレオ(ペプロマイシン;販売中止)	10mg/body	ai	3時間						○		
フルオロウラシル(5-FU)	250mg/day	ai	12～24時間			○	○	○	○	○	

day1からの投与間隔 2週間

Cmab+PTX療法

(入院)(外来)					day	1	8	15	22
薬品名	投与量	投与法	投与時間						
アービタックス(セツキシマブ)	400mg/m ²	div	2時間			○			
アービタックス(セツキシマブ)	250mg/m ²	div	1時間				○	○	○
パクリタキセル(PTX)	80mg/m ²	div	1時間			○	○	○	○

アービタックス(セツキシマブ)は初回のみ400mg/m²、2回目以降は250mg/m² 毎週投与
day1からの投与間隔 1週間

pembrolizumab(キイトルーダ)療法

(外来)					day	1	8	15	21
薬品名	投与量	投与法	投与時間						
キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200mg/body	div	30分			○			

day1からの投与間隔 3週間

Cmab(セツキシマブ;アービタックス)療法 頭頸部

(入院)(外来)					day	1	8	15	22
薬品名	投与量	投与法	投与時間						
アービタックス(セツキシマブ)	400mg/m ²	div	2時間			○			
アービタックス(セツキシマブ)	250mg/m ²	div	1時間				○	○	○

アービタックス(セツキシマブ)は初回のみ400mg/m²、2回目以降は250mg/m² 毎週投与
day1からの投与間隔 1週間